

# Arahan-arahan Kesat Sendiri

UNTUK UJIAN CEPAT ANTIGEN ABBOT PANBIO



## JANGAN TERUSKAN SEKIRANYA:



Hidung berdarah dalam masa 24 jam yang lalu



Hidung dibedah dalam masa 4 minggu yang lalu



Cedera di muka dalam masa 8 minggu yang lalu

## ATURAN CARA MENGESAT

- 1 Sila cuci tangan anda sebelum memulakan ujian.



- 2 Sebelum memulakan ujian, sila keluarkan sebatang lidi pengesat, satu alat ujian, satu botol penamparan dan satu tiub perahan. Keluarkan alat ujian dari pembungkusnya.



- 3 Buka penutup botol penamparan. Pegang botol penamparan secara menegak dan isikan tiub perahan dengan cecair penamparan sehingga ia mengalir naik mencecah garisan Penuh tiub perahan tersebut.

- 4 Keluarkan lidi pengesat dari bungkusan.



- 5 Tusukkan lidi pengesat ke dalam lubang hidung sambil memutarnya dengan perlahan. Putarkan lidi itu 5 kali.

2.0 cm



- 6 Lakukan yang sama pada lubang hidung yang satu lagi dengan pengesat yang sama.

2.0 cm



- 10 Gunakan jari anda untuk menepuk dengan lembut pada tepi tiub tersebut beberapa kali. Ini akan membancuh larutan tersebut.



- 14 Baca keputusan pada kartrij ujian tersebut. Jika anda nampak satu garisan muncul di kedudukan "C" sahaja, ini menandakan keputusan ujian negatif. Sila dapatkan rawatan perubatan dengan segera untuk penilaian selanjutnya dan ujian pengesahan.

**Jika anda nampak satu garisan muncul di kedudukan "C" sahaja, ini menandakan keputusan ujian negatif.**  
**Jika anda nampak dua garisan muncul hanya di kedudukan "T", keputusan ujian itu tidak sah. Sila ulang semula ujian menggunakan kelengkapan ujian yang lain.**

15


- Buang semua lidi pengesat, tiub reagent dan kartrij ujian yang telah digunakan ke dalam beg biobahaya.



- 16 Cuci tangan anda selepas ujian tersebut.




POSITIF



NEGATIF



TIDAK SAH



"C" Control Line ▶

"T" Test Line ▶